

PSI 2 : Réaction anaphylactique sévère chez l'adulte

Bilan et critères de gravité :

- 1) Anamnèse concise :
 - Circonstances
 - Allergènes identifiés ? Éviction possible ?
- 2) Évaluation clinique :
 - FC, PA, FR, SpO2, marbrures
 - Éruption cutanée étendue
 - État de conscience (AVPU)
- 3) Critères de gravité :
 - Arrêt cardiaque
 - Détresse respiratoire FR >30
 - Troubles de la conscience
 - Malaise à la verticalisation
 - Signes digestifs importants
 - Voix modifiée
 - Œdème de face
 - Hypotension artérielle

Actes avant bilan MRU :

- 1) Mise en sécurité du patient : position semi assise si détresse respiratoire ou jambes surélevées position allongée si hypotension artérielle
- 2) Éviction allergène
- 3) O2 Sb obj SpO2 > 94 %
- 4) Injection d'adrénaline en stylo autoinjecteur si non fait

Matériel et gestes après bilan MRU donc après PRESCRIPTION :

- 1) Adrénaline **en intra-musculaire** : 0,01 mg/Kg si < 50 kg OU 0,5 mg si ≥ 50 kg
- 2) Pose de VVP
- 3) Remplissage : 500mL NaCl 0.9% en IV en débit libre
- 4) Nébulisation de salbutamol 5mg sur signes respiratoires si DRA
- 5) Evaluation de l'intérêt d'un nouveau bolus d'adrénaline
IM 0,01 mg/Kg si < 50 kg OU 0,5 mg si ≥ 50 kg

Surveillance :

- 1) Patient scopé avec surveillance paramètres
- 2) Surveillance signes allergiques

Schéma de prise en charge et de hiérarchisation actes :

