

# FICHE RÉFLEXE SÉDATION PROCÉDURALE

## FICHE RÉFLEXE SÉDATION PROCÉDURALE

PROPOFOL	
Présentation	Ampoule de <b>200 mg/20 ml</b>
Précautions de manipulation	<b>Agiter</b> ampoule avant emploi
Utilisation pur	<b>Dans seringue de 20 ml (2mg/kg max dans seringue) 1 ml = 10 mg</b>
Posologies	1 mg/kg, puis 0,5 mg/kg, dose max 2 mg/Kg, <b>ne pas utiliser chez la personne âgée</b>
Injection IVL	<b>30 à 60 sec</b>
Intervalle entre chaque injection (titration)	<b>3-5 min (ne pas se précipiter)</b>
Délai d'action	1 à 3 min
Durée d'action	5 à 10 min
Contre-indications	Allergie au propofol, aux œufs, soja, arachides
Effets indésirables	<b>Douleur à l'injection (60% des cas), Apnée, Hypotension</b>

## FICHE RÉFLEXE SÉDATION PROCÉDURALE

KETAMINE	
Présentation	Ampoule de <b>250 mg/5 ml</b>
Dilution dans seringue de 50 ml	<b>NaCl 0,9%, Glucose 5%</b>
Dilutions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids &lt; 50 Kg et/ou personne âgée: 50 mg dans 50 ml (<b>1 ml = 1 mg</b>)</li> <li>- Poids entre 50 et 100 Kg : 100 mg dans 50 ml (<b>1 ml = 2mg</b>)</li> <li>- Poids &gt; 100 Kg ou OH chronique ou toxicomane : 150 mg dans 50 ml (<b>1 ml = 3 mg</b>)</li> </ul>
Posologies	<b>0,5 à 1,5 mg/kg max, demi-doses chez la personne âgée</b>
Injection IVL	Au moins <b>60 sec</b>
Intervalle entre chaque injection (titration)	<b>5 min</b>
Précaution d'utilisation	<b>Ambiance calme</b>
Délai d'action	1 à 3 min
Durée d'action	10 à 15 min parfois plus
Contre-indication	Coronaropathie instable
Effets indésirables	<b>Hallucinations, agitation, dépression respiratoire et hémodynamique, nausées-vomissements, laryngospasme</b>

# FICHE RÉFLEXE SÉDATION PROCÉDURALE

## MIDAZOLAM

Présentation	Ampoule de <b>5 mg/5ml</b>
Dilution	<b>pur</b>
Posologies	0,015 mg/Kg à 0,03 mg/Kg, <b>ne pas dépasser 1 mg chez la personne âgée</b>
Injection IVL ( <b>une seule injection</b> )	20 sec
Délai d'action	2 min
Durée d'action	10 min
Contre-indications	Aucune
Effets indésirables	Hypotension artérielle ( <b>surtout chez la personne âgée ou en association avec la morphine</b> )
Antagoniste	Flumazénil (Anexate®)