

PSI 8 : Convulsions chez l'enfant

Bilan et critères de gravité :

1) Anamnèse concise :

Circonstances (dont heure de début)
Épileptique connu ?
Notion de traumatisme stigmates de TC
Prise de traitement avant arrivée
Poids de l'enfant

2) Évaluation clinique :

FC, PA, FR, SpO2
État de conscience (AVPU)
Symétrie pupillaire
Température
Glycémie capillaire

3) Critères de gravité :

Arrêt cardiaque
État de mal
Traumatisme crânien récent
Détrousse respiratoire
Crise persistante malgré administration par témoin du traitement de crise adapté
Post critique > 30 min

Actes avant bilan MRU :

- 1) PLS avec LVA
- 2) O2 obj SpO2 entre 94 et 98 %

Gestes après bilan MRU donc PRESCRIPTION :

- 1) Administration BUCCOLAM si dans ttt habituel et non fait par témoins 1 dose (cf tableau selon âge)
- 2) si CTCG en cours > 5 min : Valium® IR 0,5 mg/kg 10 mg max
- 3) pose 1 VVP
- 4) Rivotril® 0,015 mg/kg (max 1,5mg)

Surveillance :

- 1) Patient scopé avec surveillance paramètres dont une prise de PA toutes les 10 min
- 2) Surveillance neurologique réveil + respiration

Schéma de prise en charge et de hiérarchisation actes :

