

Signe d'identification précoce d'un syndrome de la queue de cheval

- Perte de sensibilité / sensation de pique ou aiguilles entre la face interne de la cuisse et les organes génitaux
- Engourdissement dans ou autour de votre dos ou des fesses.
- Sensibilité altérée lors de l'utilisation de papier toilette pour vous essuyer
- Difficulté accrue lorsque vous essayez d'uriner
- Difficulté accrue lorsque vous essayez d'arrêter ou de contrôler votre flux d'urine
- Perte de sensation du assage de l'urine
- Fuite d'urine ou nécessité récente d'utiliser des protections
- Ne sait pas quand votre vessie est pleine ou vide
- Incapacité d'arrêter un écoulement intestinal ou une fuite
- Perte de sensation lors de la défécation
- Diminution d'aptitude à réaliser une érection ou à éjaculer
- Perte de sensation dans les organes génitaux pendant les rapports sexuels

Toute combinaison des signes avant-coureurs ci-dessus pourrait être un symptôme du syndrome de Queue de cheval. Consultation médecin traitant ou SAU dans les 12h.

Development of a toolkit for early identification of cauda equina syndrome. Greenhalgh S1, Truman C2, Webster V3, Selfe J4.

Prim Health Care Res Dev. 2016 Nov;17(6):559-567. Epub 2016 Apr 21.